

## **ERRATA GABARITO PRELIMINAR**

A **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAS** torna pública a presente ERRATA para retificar o gabarito preliminar do processo seletivo de Residência Médica nº 01/2025, em virtude da análise dos recursos interpostos pelos candidatos.

### **1. QUESTÃO RETIFICADA:**

**QUESTÃO 6:** Em relação à infecção por rotavírus e às suas vacinas, assinale a alternativa incorreta.

- A.** Lactentes filhos de mães infectadas pelo HIV, mesmo que assintomáticos, não podem receber as vacinas de rotavírus atualmente licenciadas.
- B.** As vacinas atualmente licenciadas são compostas de vírus vivos atenuados.
- C.** As vacinas monovalente humana e pentavalente bovino-humana demonstraram menor eficácia em países da África e da Ásia que em países da Europa e da América Latina, porém se associaram a maior impacto potencial de redução de formas graves da doença.
- D.** A primeira dose da vacina deve ser feita até os três meses e quinze dias de vida e a segunda dose, até os sete meses e 29 dias de vida.

### **1.1 JUSTIFICATIVA PARA RETIFICAÇÃO**

As rotavirose são reconhecidas como uma das principais causas de gastroenterites graves na infância, afetando praticamente todas as crianças menores de 5 anos, independentemente da classe social. Antes da introdução da vacinação, o rotavírus era considerado a principal causa de gastroenterites graves e óbitos relacionados à doença em todo o mundo.

Existem dois tipos de vacinas:

Vacina rotavírus monovalente – VR1

Suspensão oral monovalente composta por rotavírus humano vivo e atenuado. Essa é a vacina utilizada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). Ela é especialmente eficaz na prevenção de gastroenterites causadas pelo rotavírus do sorotipo G1, mas estudos demonstram que também oferece proteção cruzada contra formas graves da doença provocadas por outros sorotipos não G1 (G2, G3, G4 e G9).

Esquema de doses:

1ª dose: aos dois meses (entre 1 mês e 15 dias e 3 meses e 15 dias).

2ª dose: aos quatro meses (entre 3 meses e 15 dias e 7 meses e 29 dias).

Vacina rotavírus pentavalente – VR5

Suspensão oral pentavalente disponível na rede privada, composta por uma combinação de rotavírus de origem humana e bovina, contendo cepas vivas e atenuadas. Essa vacina protege contra os tipos G1, G2, G3, G4 e P1.

Esquema de doses:

Deve ser administrada em três doses, sendo a primeira entre 6 e 12 semanas de idade.

O intervalo mínimo entre as doses deve ser de quatro semanas.

A última dose não deve ser aplicada após 32 semanas de idade.

Após a divulgação do Gabarito Preliminar, a alternativa considerada correta foi a letra "D". Contudo, mediante análise dos recursos apresentados pelos candidatos, verificou-se que a alternativa correta é a letra "A", uma vez que lactentes filhos de mães infectadas pelo HIV, mesmo assintomáticos, não devem receber as vacinas de rotavírus atualmente licenciadas, conforme orientações técnicas e normativas vigentes.

Diante do exposto, faz-se necessária a publicação da presente ERRATA para retificação do gabarito preliminar.

## 2. GABARITO RETIFICADO

1)D	2)C	3)B	4)A	5)D	6)A	7)D	8)D	9)A	10)C
11)A	12)B	13)A	14)D	15)D	16)D	17)C	18)A	19)C	20)C

Para que chegue ao conhecimento de todos, expedimos esta **ERRATA**.

Em caso de dúvidas recorrentes, o candidato deverá entrar em contato com o Tel (19) 3543-5401 ou através do e-mail [residenciamedica@iscma.com.br](mailto:residenciamedica@iscma.com.br).

**Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araras**  
**Araras, 18 de fevereiro de 2025**